

## Fármacos antieméticos

Escuela Universitaria de Tecnología Médica

Curso 2019

### Caso clínico 1

Niño de 5 años, buen crecimiento y desarrollo. Comienza hace 4 días con diarrea y vómitos. Consulta por presentar vómitos reiterados y emergencia móvil administra metoclopramida intramuscular. A las 5 horas consulta en emergencia por distonía, con imposibilidad de lateralizar el cuello.

1. ¿Considera ud. que fue el antiemético adecuado para esta paciente? Justifique.
2. ¿A qué corresponden los síntomas que instala la paciente luego de administrada la medicación indicada?
3. Mencione mecanismo de acción de dicho antiemético y principales efectos adversos
4. ¿Qué alternativas terapéuticas conoce en este caso?

### Caso clínico 2

Mujer de 62 años, tabaquista, menopausia a los 56 años. Antecedente familiar de abuela materna fallecida por cáncer de mama. Consulta por adenopatía axilar derecha y tumoración en mama derecha de 4 meses de evolución, levemente dolorosa. Con diagnóstico de cáncer de mama se inicia tratamiento quimioterápico neoadyuvante.

1. ¿Cree necesaria la indicación de un antiemético? En ese caso, ¿cuál sería el más adecuado?
2. Mencione mecanismo de acción y perfil de efectos adversos.