

Fármacos antieméticos  
Escuela Universitaria de Tecnología Médica

Caso clínico 1

Niño de 5 años, buen crecimiento y desarrollo. Comienza hace 4 días con diarrea y vómitos. Consulta por presentar vómitos reiterados y emergencia móvil administra metoclopramida intramuscular. A las 5 horas consulta en emergencia por distonía, con imposibilidad de lateralizar el cuello.

- 1.1. ¿Considera ud. que fue el antiemético adecuado para esta paciente? Justifique.
- 1.2. ¿A qué corresponden los síntomas que instala la paciente luego de administrada la medicación indicada?
- 1.3. Mencione mecanismo de acción de dicho antiemético y perfil de seguridad.
- 1.4. ¿Qué opinión le merece la vía de administración del medicamento?
- 1.5. ¿Qué alternativas terapéuticas conoce en este caso?

Caso clínico 2

Mujer de 62 años, tabaquista, menopausia a los 56 años. Antecedente familiar de abuela materna fallecida por cáncer de mama. Consulta por adenopatía axilar derecha y tumoración en mama derecha de 4 meses de evolución, levemente dolorosa. Con diagnóstico de cáncer de mama se inicia tratamiento quimioterápico neoadyuvante.

- 1.1. ¿Cree necesaria la indicación de un antiemético? En ese caso, ¿cuál sería el más adecuado?
- 1.2. ¿Cómo lo indicaría?
- 1.3. Mencione mecanismo de acción y perfil de efectos adversos.