

DISCUSIÓN GRUPAL
Farmacología de los agentes con acción a nivel de SNC parte II
ANTICONVULSIVANTES - ANTIPSICÓTICOS 2018

1- ¿Cuál de los siguientes antipsicóticos son Típicos y cuales Atípicos?

Levomepromazina

Tiaprida

Quetiapina

Haloperidol

Risperidona

Clozapina

Aripiprazole

Clorpromazina

2- Con los arriba mencionados, ordenar de forma decreciente según su potencia a los antipsicóticos típicos

3- Mencionar al menos 3 efectos adversos característicos del uso de antipsicóticos típicos y atípicos

4- Nombre 3 anticonvulsivantes que presenten como mecanismo de acción los siguientes: antagonistas de canales de sodio, antagonistas de canales de calcio y potenciadores de la inhibición gabaérgica

5- Indicar Verdadero (V) o Falso (F)

a- Los anticonvulsivantes se emplean solo en las crisis epilépticas

b- Lamotrigina antagoniza canales de Ca^{2+}

c- Las benzodiazepinas los únicos FAE que modulan los receptores GABA_A

d- Levetiracetam antagoniza canales de Calcio tipo T

e- Lamotrigina puede presentar como efecto adverso síndrome de Stevens - Johnson

f- El consumo de FAE no altera las descargas epilépticas interictales en el EEG

g- Los FAE no son capaces de desencadenar crisis epilépticas

6- 15 años, epilepsia crisis de ausencia en tratamiento hace un mes con ácido valproico 400 mg al día. Qué efectos adversos se deben monitorizar en este paciente?

7- 11 meses, epiléptico en tratamiento con fenobarbital 60 mg/día desde hace un mes. Consulta en policlínica por erupción cutánea en tronco.

Qué efectos adversos debe sospechar? Qué otros elementos clínicos debería conocer?