

Farmacología de los agentes con acción a nivel de SNC parte II

ANTICONVULSIVANTES - ANTIPSICÓTICOS 2019

1- ¿Cuál de los siguientes antipsicóticos son típicos y cuáles atípicos?

Levomepromazina
Tiaprida
Quetiapina
Haloperidol
Risperidona
Clozapina
Aripiprazole
Clorpromazina

2- Mencionar al menos 3 efectos adversos característicos del uso de antipsicóticos típicos y atípicos

3- Nombre 3 anticonvulsivantes que presenten como mecanismo de acción los siguientes: antagonistas de canales de sodio, antagonistas de canales de calcio y potenciadores de la inhibición gabaérgica.

4- 15 años, sexo femenino, epilepsia tipo crisis de ausencia en tratamiento hace un mes con ácido valproico 400 mg al día. ¿Qué efectos adversos se deben monitorizar en esta paciente?

5- 11 meses, epiléptico en tratamiento con fenobarbital 60 mg/día desde hace un mes. Concorre a su consulta a realizarse un EEG y le cuenta que hace 24 horas comienza con fiebre y odinofagia y posteriormente nota erupción cutánea (lesiones de cara, cuello y tronco inicialmente máculo-papulosas que evolucionan a flictenas con contenido hemorrágico).

- A. Que efecto adverso debería sospechar? Qué elementos clínicos considera para el diagnóstico?
- B.Cuál sería su conducta?