


En nuestro país recientemente se suspendió la comercialización de domperidona ampollas para su uso intravenoso, estando disponible las presentaciones para vía oral.

Departamento de Farmacología y Terapéutica 

DOMPERIDONA

INDICACIONES APROBADAS

- Alivio de los síntomas de náuseas y vómitos.
- Utilizar en la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo posible necesario para controlar las náuseas y los vómitos.

Pauta de administración

Adultos y mayores de 12 años:
Cápsulas 10 mg: **hasta tres veces al día con una dosis máxima de 30 mg al día.**
Suspensión oral 10 mg/5 ml: **hasta tres veces al día con una dosis máxima de 30 mg al día.**

REACCIONES ADVERSAS

- Con las dosis mencionadas las RAM son raras (1/1000) a muy raras (1/10000)*
- Raras: galactoreas, ginecomastia
- Muy raras: arritmias ventriculares, prolongación del QTc, calambres, urticaria

*AEUMPS

Desde el Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina de la Udelar se realizan las siguientes apreciaciones y recomendaciones para racionalizar su uso:

- El riesgo cardiovascular de prolongación del QT y arritmias es compartido por los principales antieméticos (domperidona, metoclopramida y ondansetrón), si bien existe mayor nivel de evidencia de riesgo con el uso de domperidona. Este riesgo es conocido de larga data, con múltiples alertas al respecto a nivel internacional.

- Debe respetarse la indicación aprobada de domperidona como antiemético y restringir su uso a ésta.

- Deben evitarse las dosis superiores a 30 mgrs por día.

- Evitar su uso en conjunto con otros fármacos que prolonguen el intervalo QT o fármacos que inhiban el citocromo CYP3A4

- Evitar su uso en pacientes mayores de 60 años.

- Evitar el uso prolongado.

- Los pacientes con patología cardiovascular previa son una población de riesgo para su uso.